

京大戟

牛奶浆草



山猫儿眼草

龙虎草

味苦

性寒

有毒





三棱状球形



痰饮积聚

消肿散结

水肿胀满

痰饮积聚

痈肿疔毒

痈肿疮毒

痰火瘰疬





大戟

大戟甘寒，消水利便，
腹胀症坚，其功瞑眩。

大戟别称：京大戟（北京植物志，福建植物志），湖北大戟（湖北植物志），药用别称：牛奶浆草、山猫儿眼草、千层塔、下马、龙虎草。是大戟科大戟属多年生草本植物，高可达80厘米。根圆锥状。茎直立，被白色短柔毛，上部分枝。叶互生。矩圆状披针形至披针形。杯状花序总苞坛形。蒴果三棱状球形，表面具疣状突起。种子卵形，光滑。生长于山坡、路边、荒坡或草丛中。靠种子繁殖。

根入药，逐水通便，消肿散结，主治水肿，并有通经之效；亦可作兽药用；有毒，宜慎用。

味苦，性寒，有毒。入肺、脾、肾经。主治水肿胀满、痰饮积聚、痈肿疔毒、二便不通。也可用于痰饮积聚，胸膈胀满，胁肋隐痛。消肿散结可用于痈肿疮毒及痰火瘰疬，内服外用均可。时珍曰：其根辛苦，戟人咽喉，故名。今俚人呼为下马仙，言利人甚速也。郭璞注《尔雅》云：莽，巨，即大戟也。





根有药用价值









【功效】泻水逐饮，消肿散结。

【用法用量】煎服，1.5~3g；入丸、散服，每次1g。
外用适量，生用。内服醋制用，以减低毒性。

【使用注意】本品峻泻有毒。虚弱者及孕妇忌用。反甘草，不宜与甘草同用。